

AMINOVITAL



Typ:
Płynny organiczny nawóz
azotowy do nawożenia dolistnego



SKŁAD:
Wolne aminokwasy 45%
Azot ogółem: 7%

OPIS PRODUKTU

AMINOVITAL jest organicznym nawozem dolistnym w formie płynnej, mającym zrównoważony pod kątem aminokwasów skład oraz zawierający wszystkie biologicznie aktywne L - alfa aminokwasy dostępne dla roślin. Produkt otrzymywany jest w procesie hydrolizy naturalnych białek. Dzięki szybkiej absorpcji przez liście i ułatwionemu transportowi w tkankach roślinnych, AMINOVITAL działa jako biostymulator podczas okresów związanych ze stresem biotycznym lub abiotycznym. Wolne aminokwasy zawarte w AMINOVITAL biorą udział w syntezie białek i w reakcjach enzymatycznych niezbędnych w rozwoju rośliny. Produkt ma właściwości poprawiające wydajność nawozów dolistnych i niektórych środków ochrony roślin.

MIESZALNOŚĆ

AMINOVITAL jest kompatybilny z większością zwykle stosowanych nawozów oraz agrochemikaliów, z wyłączeniem preparatów zawierających miedź, siarkę i produktów alkalicznych ($\text{pH} > 8$). Zalecane jest wykonanie testu przed wymieszaniem. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy wykonać próby w mniejszej ilości wody. Wykonywanie mieszanin zbiornikowych tylko na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Wypełnić zbiornik do połowy wodą i wlać odmierzoną ilość preparatu AMINOVITAL. Następnie wypełnić zbiornik do pełna całą czas mieszając ciecz roboczą. W celu polepszenia nawożenia dolistnego zastosowanie AMINOVITAL powinno odbyć się wcześniej rano lub wieczorem. Po użyciu pojemnik z nawozem dobrze wypłukać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C.

Środki ostrożności: S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 4°C do 35°C. Składowanie w nieodpowiednich warunkach (np. w temp. poniżej 4°C) może prowadzić do nieodwracalnych zmian w jakości nawozu. Produktu nie należy składować warstwami. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu aż do zużycia.

NFU 42-001

Preparat wprowadzony do obrotu wg. art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Okres przydatności do stosowania: 3 lata od daty produkcji

Data produkcji i numer partii na opakowaniu

POJEMNOŚĆ

5L

Masa netto: 6 kg



CALFERT

ZALECENIA STOSOWANIA

UPRAWA	TERMINY I ZALECENIA	DAWKA
Jabłoń, Grusza	Wykonywać zabiegi od fazy zielonego pąka do kwitnienia, 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	2-3 l/ha
	Kolejne zabiegi wykonać po kwitnieniu, 2-3 razy co 7-10 dni oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.	2-3 l/ha
Wiśnia, Czeresnia, Śliwa	Wykonywać zabiegi od fazy białego pąka do kwitnienia, 2-3 zabiegi co 7 dni.	2-3 l/ha
	Kolejne zabiegi wykonać po kwitnieniu, 2-3 razy co 7-10 dni oraz w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.	2-3 l/ha
Truskawki	Pierwsze zabiegi wykonać na początku wegetacji, potem kolejno 2-3 zabiegi co 7-10 dni do okresu kwitnienia.	2-3 l/ha
	Wykonać 2 zabiegi co 7-10 dni w czasie kwitnienia i tuż po kwitnieniu.	1-2 l/ha
	W czasie wzrostu i dojrzewania owoców wykonać 2-3 zabiegi co 7-10 dni.	1-2 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi 14-21 dni po zbiorach owoców, szczególnie tuż po koszeniu liści.	2-3 l/ha
Maliny	Pierwsze zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji, gdy pojawią się pierwsze młode w pełni wykształcone liście.	2-3 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi co 7-14 dni wykonywać w czasie intensywnego przyrostu pędów i liści.	1-3 l/ha
	Wykonać 1-2 zabiegi w czasie kwitnienia co 7-14 dni.	1-3 l/ha
	W przypadku malin odmian letnich wykonać 1-2 zabiegi po zbiorach owoców.	2-3 l/ha
Borówka	Pierwsze zabiegi wykonać po ruszeniu wegetacji, gdy pojawią się pierwsze młode w pełni wykształcone liście.	2-3 l/ha
	Wykonać 1-2 zabiegi w czasie kwitnienia co 7-14 dni.	1-3 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi po kwitnieniu w czasie wzrostu i dojrzewania owoców.	2-3 l/ha
Warzywa gruntowe	Pierwszy zabieg wykonać 7-14 dni po wschodach lub po posadzeniu rozsady na miejsce stałe.	2-3 l/ha
	Kolejne zabiegi wykonywać w czasie intensywnego przyrostu masy roślinnej.	2-3 l/ha
	W razie problemów we wzroście roślin lub w czasie wystąpienia stresu wykonać zabieg i powtórzyć po 7-14 dniach.	2-3 l/ha
Zboża, rzepak	W przypadku uprawy ozimín wykonać pierwszy zabieg 14-21 dni po wschodzie i powtórzyć po 14 dniach.	0,5-2 l/ha
	Włosną po ruszeniu wegetacji lub 14 dni po wschodzie wykonać 2-3 zabiegi.	0,5-2 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu.	1-3 l/ha
Ziemniak	Pierwszy zabieg wykonać 7-14 dni po wschodach.	1-3 l/ha
	Kolejne 2-4 zabiegi co 7-14 dni w czasie intensywnego przrastania masy zielonej.	1-3 l/ha