

CyBorg Cynkowo-Borowy

Wieloskładnikowy nieorganiczny nawóz CE z mikroelementami rozpuszczalnymi w wodzie - borem (B) i cynkiem (Zn)

CE

SKŁAD (w/w):
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie w formie boroetyloaminy - 2%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie w formie chlorku cynku - 8%
Składniki: (1)CMCI Pierwotne surowce i mieszaniny
Boroetyloamina (CAS n° 26038-87-9)
Chlorek cynku (CAS n° 7646-85-7)



OPIS PRODUKTU

CyBorg Cynkowo-Borowy to nawóz zawierający ważne mikroelementy: bor występujący w formie boroetyloaminy oraz cynk w formie chlorku cynku. Nawóz należy stosować przed zakończeniem wegetacji roślin celem przygotowania roślin do spoczynku zimowego oraz na początku wegetacji, aby rośliny prawidłowo rozpoczęły wegetację w danym sezonie. Dzięki zawartości cynku nawóz podnosi wytrzymałość roślin na niską temperaturę. Oba pierwiastki odgrywają szczególną rolę w okresie okółkwitnieniowym oraz w czasie wzrostu i rozwoju zawiązków. CyBorg Cynkowo-Borowy to doskonałe źródło cynku i boru. Dolistne stosowanie nawozu uzupełnia w roślinie te dwa ważne pierwiastki. Nawóz przeznaczony jest do pozakorzeniowej aplikacji w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. W celu zwiększenia efektywności transportu boru i cynku w roślinie oraz zapewnienia roślinom optymalnego rozwoju zaleca się stosowanie produktu w mieszaninie z dodatkiem organicznego stymulatora wzrostu roślin, opartego na aminokwasach, AminoVital Power w dawce 0,25-0,5 kg/ha. Zalecenia łącznego stosowania CyBorg Cynkowo-Borowy z AminoVital Power nie dotyczą aplikacji jesiennych, gdy preparat jest stosowany po 15 września.

SPORZĄDZENIE CIECZY ROBOCZEJ

Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło. **Przed zastosowaniem należy bardzo dobrze wstrząsnąć opakowaniem.** Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu CyBorg Cynkowo-Borowy, następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą do wymaganej objętości zbiornika. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz CyBorg Cynkowo-Borowy może wykazywać dobre zdolności do tworzenia mieszanin. Nie należy nawozu mieszać z preparatami miedziowymi, siarkowymi, zawierającymi oleje mineralne. Nie stosować z preparatami silnie alkalizującymi. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej, należy sprawdzić zdolność mieszaniny preparatów w mniejszym naczyniu. Użytkownik wykonuje mieszaninę zbiornikową na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność. Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe sporządzanie mieszanin zbiornikowych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu z dala od dzieci. Nie należy przechowywać produktu z paszami i pożywieniem. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +8°C do +35°C. Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym i suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H411 Dział toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub przyszyć).

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P391 Zebrać wyciek.

ZALECENIA STOSOWANIA DOLISTNEGO		
UPRAWA	TERMINY I ZALECENIA	DAWKA
Jabłoni, Grusza	Pierwsze 1-2 zabiegi należy wykonać po pojawieniu się pierwszych zielonych części i powtórzyć po 7 dniach. Kolejne zabiegi należy wykonać przed kwitnieniem i po kwitnieniu.	0,5-2 l/ha
	Ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców, przed zakończeniem wegetacji.	1-3 l/ha
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa	Pierwszy zabieg wykonać w fazie białego pąka.	0,5-1 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po kwitnieniu, w czasie wzrostu zawiązków.	0,5-1,5 l/ha
Truskawka	Ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji.	1-3 l/ha
	Pierwsze 3-4 zabiegi co 7 dni wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka.	1-3 l/ha
Maliny letnie	Dla plantacji pozostawionych na kolejny sezon wegetacyjny ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji.	1,5-3 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wczesnych fazach rozwojowych do początku kwitnienia.	0,5-2 l/ha
Maliny jesienne	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji.	1-3 l/ha
	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać na początku wegetacji w czasie intensywnego wzrostu pędów jednorocznych.	0,5-2 l/ha
Borówka	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji.	1-3 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wczesnych fazach rozwojowych do początku kwitnienia.	0,5-2 l/ha
Zboża ozime	Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji.	0,5-3 l/ha
	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać jesienią od fazy 3-6 liści.	0,5-1,5 l/ha
Ziemniaki	Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną w czasie krzewienia.	0,5-1,5 l/ha
	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać od momentu zakrywania redlin przez roślinę.	0,5-1,5 l/ha
Zboża jare	Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego przyrostu.	0,5-1,5 l/ha
	Pierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego wzrostu liści oraz powtórzyć w czasie krzewienia.	0,5-1,5 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści.	1-3 l/ha
Rzepak	Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-5 liści, powtórzyć po 7 dniach.	1-3 l/ha
	Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy zwartego pąka.	1-3 l/ha
Kapusta głowiasta, Kapusta pekińska	Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po wysadzeniu rozsady, kolejne 2-3 zabiegi w fazie intensywnego przyrostu masy zielonej.	1-3 l/ha
Marchewka, pietruszka, burak	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej.	1-3 l/ha
Pomidor, Papryka	Pierwsze zabiegi wykonać 14 dni po wysadzeniu rozsady, kolejne 2-3 zabiegi przed kwitnieniem i na początku kwitnienia. Wykonać 2-3 zabiegi w czasie wzrostu zawiązków owocowych.	1-2 l/ha
Ogórek	Pierwsze zabiegi wykonać 14 dni po wysadzeniu rozsady, kolejne 2-3 zabiegi przed i na początku kwitnienia. Wykonać 2-3 zabiegi w czasie wzrostu zawiązków owocowych.	1-3 l/ha

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W ZIADNIONIEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANEJ DAWKI.

Zawiera: chlorek cynku(II); dichlorek cynku 17,3 % (EC: 231-592-0)

UFI: RJXC-JFCM-FOOF-GGWO



Data produkcji:

Data ważności:

Nr partii:

11
masa netto 1.4kg

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul.Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl

