

MONOTON CYNK 146

Skład nawozu (% m/v):

Siarka (SO_3) rozpuszczalna w wodzie - 14%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 11,5%

Składniki:

Siarczan cynku¹ CAS - 7733-02-0

¹)CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny



Mineralny nawóz mikroskładnikowy (PFC 1(C)(II)(a))
Nawóz mikroskładnikowy w postaci roztworu,
zawierający mikroskładnik pokarmowy cynk
oraz makroskładnik pokarmowy siarkę.

OPIS PRODUKTU

Monoton CYNK 146 to płynny nawóz dolistny do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych - jagodowych, sadowniczych, warzywniczych, w polu i pod osłonami. Produkt zapewnia odżywianie roślin cynkiem i siarką. Monoton CYNK 146 dostarcza roślinom doskonale przyswajalny cynk niezbędny w okresie deficytu tego pierwiastka oraz w okresach, gdy jego pobieranie jest ograniczone. Szczególnie zaleca się stosowanie tego produktu na początku sezonu wegetacyjnego, przed kwitnieniem. Dolistna aplikacja Monoton CYNK 146 wspiera procesy zapłodnienia i zawiązywania owoców, reguluje przebieg kwitnienia, wzmacnia rozwój roślin, poprawia odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym na przymrozki oraz poprawia mrozoodporność roślin. Formuła cynku zawarta w nawozie skutecznie zapobiega niedoborom tego mikroskładnika, minimalizując ryzyko wystąpienia dysfunkcji fizjologicznych wywołanych jego brakiem, takich jak chloroza młodych liści oraz zaburzenia w rozwoju kwiatów, owoców i nasion. Produktu nie należy stosować w pełni kwitnienia, gdy są otwarte kwiaty. Nawóz Monoton CYNK 146 jest łagodny dla roślin i środowiska.

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu ułożonym maksymalnie w trzech warstwach. Chronić przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania: od 5°C do 35°C. Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Przy rozlaniu należy zebrać ciecz, a zalaną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ DO APLIKACJI DOLISTNEJ

Przed użyciem nawozu Monoton CYNK 146 należy wstrząsnąć opakowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło w opryskiwacz. Do zbiornika dodać odmierzoną ilość nawozu Monoton CYNK 146, nie przekraczać zalecanych dawek. Następnie można dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą w zbiorniku opryskiwacza do wymaganej objętości. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone. Po wykonaniu zabiegu i opróżnieniu zbiornika wszystkie elementy opryskiwacza należy dokładnie umyć, przepłukując czystą wodą.

MIESZALNOŚĆ

Nawóz Monoton CYNK 146 może wykazywać różne zdolności do tworzenia mieszanin. Nie mieszać z preparatami zasadowymi. Każdorazowo przed stworzeniem mieszaniny należy sprawdzić zdolność mieszania poszczególnych preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszanie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ani producent, ani dystrybutor nawozu nie odpowiadają za szkody i wady powstałe w wyniku sporządzanych mieszanin zbiornikowych. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania i zalecanych dawek. Przed sporządzeniem roztworu roboczego w opryskiwaczu należy przeprowadzić próbę mieszalności wszystkich składników.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produktu nie należy spożywać. W przypadku połknięcia skontaktuj się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu skontaktuj się z lekarzem. Stosować okulary oraz rękawice ochronne i odzież ochronną. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:



UWAGA

Zwróty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwróty wskazujące środki ostrożności:

P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P301 + 312: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatrucia lub lekarzem.

P280: Stosować ochronę oczu. P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P391: Zebrać wyciek

DAWKOWANIE – aplikacja dolistna

Należy stosować zgodnie z etykietą i nie przekraczać zalecanych dawek.

Uprawa	Termin stosowania	Dawka
Jabłoni, grusza	W fazie zielonego pąka: 2 zabiegi w odstępie 7 dni.	1-2 l/ha
	Przed kwitnieniem.	0,5-1,5 l/ha
Wiśnia, czereśnia, brzoskwinia	Po zbiorach owoców w czasie przygotowywania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	1,5-2,5 l/ha
	Pierwszy zabieg: po ruszeniu wegetacji.	1-2 l/ha
	Kolejne zabiegi: przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu - w odstępie 7 dni.	0,5-1,5 l/ha
Truskawki w polu i pod osłonami	Po zbiorach owoców w czasie przygotowywania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	1,5-2,5 l/ha
	Po ruszeniu wegetacji lub po wysadzeniu młodych roślin w miejsce stałe.	1-2 l/ha
Malina i jeżyna w polu i pod osłonami	Przed kwitnieniem.	1 l/ha
	Po zbiorach owoców, w czasie przygotowywania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	2 l/ha
Borówka wysoka	W fazie zielonego pąka: 2 zabiegi w odstępie 7 dni.	1-2 l/ha
	Przed kwitnieniem.	1,5-2 l/ha
Zboża ozime	Po zbiorach owoców w czasie przygotowywania roślin do spoczynku zimowego, przed opadaniem liści: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	1,5-2,5 l/ha
	Jesienią w fazie 3-6 liści.	0,5-1,5 l/ha
Zboża jare	Wiosną: 2-3 zabiegi co 7-14 dni.	0,5-1 l/ha
	W fazie 3-6 liści: 2 zabiegi w odstępie 7-14 dni.	0,5-1 l/ha
Kukurydza	W fazie 4-8 liści właściwych.	0,5-2 l/ha
Ziemniaki	Przed kwitnieniem.	0,5-2 l/ha
Rzepak	W czasie formowania pędów: 2 zabiegi w odstępie 7-14 dni.	1-1,5 l/ha
Burak cukrowy	3 zabiegi: jesienią w fazie 4-8 liści właściwych, faza 9 liści właściwych, wzrost rozety liściowej (przed zakończeniem międzyrzędzi) oraz po zauważeniu pierwszych objawów chłostki buraka.	0,5-2 l/ha
Rosliny strączkowe	Zabiegi co 10-14 dni: faza 4-8 liści właściwych, faza 9 liści właściwych, wzrost rozety liściowej (przed zakończeniem międzyrzędzi) oraz po zauważeniu pierwszych objawów chłostki buraka.	0,5-1,5 l/ha
Pomidor, papryka	2 zabiegi: w czasie rozwoju pędów bocznych i w czasie rozwoju pąków kwiatowych.	1-1,5 l/ha
Ogórek, dynia	Przed kwitnieniem.	0,5-1,5 l/ha
Kapusta głowiasta	Po kwitnieniu: 2 zabiegi w odstępie 7 dni.	0,5-1,5 l/ha
Kapusta pekińska	Przed kwitnieniem.	0,5-1,5 l/ha
Kalafior, brokuł	W czasie wiązania owoców: 2 zabiegi w odstępie 14 dni.	0,5-1,5 l/ha
Marchewka, pietruszka	Od fazy 4 liści: 2-3 zabiegi co 7 dni.	1-2 l/ha
Seler	W czasie wzrostu i rozwoju liści: zabiegi co 7-10 dni.	1-2 l/ha
Fasola, groch	Pierwszy zabieg: w czasie intensywnego wzrostu liści. Kolejne zabiegi: co 7 dni w okresie formowania róży oraz w czasie wzrostu i rozwoju róży.	1-2 l/ha
	W czasie intensywnego wzrostu naci oraz w fazie grubienia korzenia.	1-2 l/ha
	Pierwszy zabieg: intensywny rozwój rozety liściowej. Drugi zabieg: początek grubienia korzenia. Kolejne 1-2 zabiegi: intensywne grubienie korzenia.	1-2 l/ha
	W okresie kwitnienia i zawiązywania strąków: 2-3 zabiegi co 7 dni.	0,5-1,5 l/ha



Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 456 19 65 biuro@calfert.pl www.calfert.pl

Nr partii:

Data produkcji:

Data ważności: 2 lata od daty produkcji

CE 1L
masa netto 1,27 kg