

OPTYMAL FILM

ATEST nr PZH/BT - 3575/2019

OPIS PRODUKTU

OPTYMAL FILM to innowacyjny adiuwant do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin, nawozami dolistnymi, regulatorami wzrostu i biostymulatorami. OPTYMAL FILM korzystnie modyfikuje ciecz roboczą, zwiększając skuteczność wykonywanych zabiegów i wydłużając działanie aplikowanych substancji. Poprawia przyleganie cieczy roboczej do powierzchni liści (więcej substancji pozostaje na roślinie), dzięki czemu ciecz jest mniej podatna na znoszenie przez wiatr i spłukiwanie przez deszcz.

- Ogranicza znoszenia kropel przez podmuchy wiatru i zmywanie substancji aktywnych z powierzchni rośliny
- Przedłuża i ułatwia wnikanie substancji do wnętrza tkanek roślinnych
- Tworzy ochronną warstwę na owocach ograniczając ich pękanie
- Przyczynia się do lepszego wykorzystania przez roślinę składników pokarmowych aplikowanych w zabiegach dolistnych
- Zwiększa przyleganie cieczy roboczej do powierzchni rośliny

MIESZALNOŚĆ

OPTYMAL FILM może być mieszany z większością środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, regulatorów wzrostu lub biostymulatorów. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić możliwość mieszania preparatów w mniejszej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własną odpowiedzialność.

SKŁAD:
Oligomery terpenowe – 96,3%
(w 100% pochodzenia roślinnego)

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem, odmierzyć zalecaną dawkę i wlać OPTYMAL FILM do pojemnika z ciepłą wodą (temperatura ok. 25°C-30°C). Preparat wraz z wodą należy dobrze wymieszać. Z pojemnika ciecz wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 80-90% wodą. Roztwór adiuwant OPTYMAL FILM do zbiornika opryskiwacza wlewamy jako ostatni preparat, po uprzednim rozpuszczeniu się w wodzie wszystkich dodanych preparatów. Podczas dodawania do zbiornika roztworu z OPTYMAL FILM mieszało musi być włączone. Po dodaniu do zbiornika wszystkich preparatów należy go wypełnić w całości wodą. W czasie przejazdu oraz w trakcie wykonywania zabiegu mieszało musi być włączone

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci, miejsc narażonych na otwartą operację słoneczną oraz w pobliżu otwartego ognia. Nie przechowywać z żywnością i paszami. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. W razie rozlania środka wytrzeć, stosując środki ochrony indywidualnej, zanieczyszczone miejsce dokładnie spłukać wodą.

DAWKOWANIE

STOSOWANIE	DAWKA
Do środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, biostymulatorów i regulatorów wzrostu we wszystkich uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.	200 ml na każde 100 l wody (do 400 litrów wody na ha) 100 ml na każde 100 l wody (powyżej 500 litrów wody na ha)
Ograniczenie transpiracji młodych roślin zaraz po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe.	200-400 ml na każde 100 l wody
Ograniczenie pękania owoców czereśni i wiśni. Zabieg wykonać, gdy owoc osiągnie już swoją wielkość, ale przed procesem wybarwiania.	2-4 l na każde 100 l wody, po upływie 7 i 14 dni zabieg należy powtórzyć

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA

H315 – działa drażniąco na skórę.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochroną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P332+P313 W przypadku wystąpienia porażenia skóry zasięgnąć porady /zgłosić się do lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P50 Zawartość pojemnika poddać utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją.

Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji: 01.2019

Nr partii: ASCHTF-19-01



Objętość: **11**
(masa netto 1,35 kg)

